

接種医師と相談のうえ、予防接種を理解し、正しく受けましょう。

子どもの標準的な予防接種スケジュール

ワクチン	種類	6週 間	2か 月	3か 月	4か 月	5か 月	6か 月	7か 月	8か 月	9-11か 月	12-15 か月	16-17 か月	18-23 か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上		
ロタウイルス 1価	経口 生		①	②	(注1)計2回、②は生後24週0日までに完了すること										※定期接種開始は令和2年10月1日から									
ロタウイルス 5価			①	②	③	(注2)計3回、③は生後32週0日までに完了すること																		
インフルエンザ菌 b型(Hib)	不活化		①	②	③	④																		
小児用肺炎球菌	不活化		①	②	③	④																		
B型肝炎	不活化		①	②	③																			
四種混合 (DPT-IPV)	不活化		①	②	③			④																
BCG	生		①																					
麻疹、風しん (MR)	生											①	② ※1										小学校入学前の1年間	
水痘 (水ぼうそう)	生											①		②										
日本脳炎	不活化											①	②	③	④9-12歳 ※2									
二種混合(DT)	不活化											①11歳-12歳 (2期) ※3												
子宮頸がん (HPV)	不活化											中1 小6 ①②③ ※4 中2-高1												

①～④は接種回数

標準的な接種期間

法的接種期間

※1 小学校に就学前年度に通知及び予診票送付

※2 小学校4年生に通知及び予診票送付

※3 小学校6年生に通知及び予診票送付

※4 希望される方に予診票交付

注 経口生ワクチン以外の生ワクチンを接種した日から別の種類の生ワクチンを接種するには、27日以上間隔をあげれば接種できます。

全額公費負担 定期予防接種(A類疾病)

令和2年8月現在

種類	対象年齢	回数	標準的な間隔等
ロタウイルスワクチン ※接種する種類により 接種回数が異なります。	1価 生後6週0日から24週0日まで (生後24週0日までの間に4週間以上の間隔を置いて2回)	2回	初回接種は、 生後14週6日 (3カ月半過ぎ) までに接種
	5価 生後6週0日から32週0日まで (生後32週0日までの間に4週間以上の間隔を置いて3回)	3回	
インフルエンザ菌 b型(Hib) ※接種開始時期により 接種回数が異なります。	初回:接種時年齢が生後2か月から7か月未満の場合 (生後12か月に至るまでに初回接種3回完了) 追加:初回接種3回終了後7か月から13か月の間	3回 1回	27日～56日
	初回:接種時年齢が生後7か月から12か月未満の場合 (生後12か月に至るまでに初回接種2回完了) 追加:初回接種2回終了後7か月から13か月の間	2回 1回	27日～56日
	初回:接種時年齢が生後1歳から5歳未満の場合	1回	
小児用肺炎球菌 ※接種開始時期により 接種回数が異なります。	初回:接種時年齢が生後2か月から7か月未満の場合 (生後24か月に至るまでに初回3回完了、ただし、2回目は1歳を超え 追加:1歳を過ぎて、初回接種3回終了後60日以上間隔を置いて	3回 1回	27日以上
	初回:接種時年齢が生後7か月から12か月未満の場合 (生後24か月に至るまでに初回2回完了) 追加:1歳を過ぎて、初回接種2回終了後60日以上間隔を置いて	2回 1回	27日以上
	初回:接種時年齢が生後1歳から2歳未満の場合 追加:初回接種終了後、60日以上間隔を置いて	1回 1回	
	初回:接種時年齢が生後2歳から5歳未満の場合	1回	
B型肝炎	生後1歳未満	3回	27日以上あけて2回 1回目から139日以上 あけて1回
四種混合 (DPT-IPV)	1期初回:生後3か月から7歳6か月未満	3回	20～56日
	1期追加:7歳6か月未満	1回	1期初回終了後 1年～1年6か月
BCG	生後1歳未満	1回	
麻疹、風しん(MR)	1期:1歳～2歳未満	1回	
	2期:5歳から7歳未満で小学校就学の前年度(年長児)	1回	
水痘 (水ぼうそう)	初回:12か月から36か月に至るまで	1回	初回接種終了後 3か月以上
	追加:36か月に至るまで	1回	
日本脳炎	1期初回:3歳から7歳6か月未満	2回	6日～28日
	1期追加:7歳6か月未満	1回	1期初回終了後 おおむね1年
	2期:9歳から13歳未満	1回	
二種混合(DT)	2期:11歳から13歳未満	1回	
子宮頸がん (HPV)	中学1年生から高校1年生相当の女子 初回接種から サーバリックスは1か月後、6か月後の各1回 ガーダシルは2か月後、6か月後の各1回	3回	