

接種医師と相談のうえ、予防接種を理解し、正しく受けましょう。

子どもの標準的な予防接種スケジュール

ワクチン	種類	6週 間	2か 月	3か 月	4か 月	5か 月	6か 月	7か 月	8か 月	9-11か 月	12-15 か月	16-17 か月	18-23 か月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上
ロタウイルス	1価	経口	①	②	(注1) 計2回、②は生後24週0日までに完了すること																	
	5価	生	①	②	③	(注2) 計3回、③は生後32週0日までに完了すること																
小児用肺炎球菌	不活化	①	②	③																		
B型肝炎	不活化	①	②																			
五種混合	不活化	①	②																			
BCG	生																					
麻しん、風しん(MR)	生																					
水痘(水ぼうそう)	生																					
日本脳炎	不活化																					
二種混合(DT)	不活化																					
子宮頸がん(HPV)	不活化																					

■ は、標準的な接種期間

■ は、法的接種期間

①～④は接種回数

※1 小学校に就学前年度に通知及び予診票送付

※2 小学校4年生に通知及び予診票送付

※3 小学校6年生に通知及び予診票送付

※4 小学校6年生女子に通知及び予診票送付

注 経口生ワクチン以外の生ワクチンを接種した日から別の種類の生ワクチンを接種するには、27日以上間隔をあければ接種できます。

全額公費負担 定期予防接種(A類疾病)

令和8年4月現在

種類	対象年齢	回数	標準的な間隔等
ロタウイルスワクチン ※接種する種類により 接種回数が異なります。	1価 生後6週0日から24週0日まで (生後24週0日までの間に4週間以上の間隔をおいて2回)	2回	初回接種は、生後14週6日 (3カ月半過ぎ)までに接種
	5価 生後6週0日から32週0日まで (生後32週0日までの間に4週間以上の間隔をおいて3回)	3回	
小児用肺炎球菌 ※接種開始時期により 接種回数が異なります。	初回：接種時年齢が生後2か月から7か月未満の場合 (生後24か月に至るまでに初回接種3回完了、ただし、2回目は1歳を超えない) 追加：1歳を過ぎて、初回接種3回終了後60日以上間隔をあけて	3回 1回	27日以上
	初回：接種時年齢が生後7か月から12か月未満の場合 (生後24か月に至るまでに初回接種2回完了) 追加：1歳を過ぎて、初回接種2回終了後60日以上間隔をあけて	2回 1回	27日以上
	初回：接種時年齢が生後1歳から2歳未満の場合 追加：初回接種終了後、60日以上間隔をあけて	1回 1回	
	初回：接種時年齢が生後2歳から5歳未満の場合	1回	
B型肝炎	生後1歳未満	3回	27日以上あけて2回 1回目から139日以上あけて1回
五種混合	1期初回：生後2か月から7歳6か月未満	3回	20日～56日
	1期追加：7歳6か月未満	1回	1期初回終了後6か月～18か月
BCG	生後1歳未満	1回	
麻しん、風しん(MR)	1期：1歳～2歳未満	1回	
	2期：5歳から7歳未満で小学校就学の前年度(年長児)	1回	
水痘(水ぼうそう)	生後12か月から36か月に至るまで	1回	3か月以上
日本脳炎	1期初回：生後6か月から7歳6か月未満	2回	6日～28日
	1期追加：7歳6か月未満	1回	1期初回終了後 おおむね1年
	2期：9歳から13歳未満	1回	
二種混合(DT)	2期：11歳から13歳未満	1回	
子宮頸がん(HPV)	小学6年生から高校1年生相当の女子	3回	